

各 位

2008年7月4日
株式会社キョーリン
東京都千代田区神田駿河台2-5

2008年7月 追補収載品の新発売のお知らせ

株式会社キョーリン（本社 東京都、代表取締役社長 古城格）の子会社であるキョーリンリメディオ株式会社（本社 石川県金沢市 社長 松田孝）は、2008年7月追補収載品3成分4品目を本日、新発売いたしました。

同社は特色ある複合ヘルスケア企業を目指すキョーリングroupの中でジェネリック（後発）医薬品事業を主に行い、社会から信頼感を得ることを目標に掲げ、「品質と品揃えの確保」「安定供給の確保」「医療関係者への情報提供体制の確立」を軸に取り組んでいます。

今後もキョーリンリメディオ（株）は、信頼感のあるジェネリック医薬品を発売することによりキョーリングroupの一員として健康貢献という企業理念の具現化を目指します。

記

品 名	包 装
アムロジピン錠2.5mg「PH」	30錠、100錠、500錠、1000錠、 3000錠、バラ包装1000錠
アムロジピン錠5mg「PH」	30錠、100錠、500錠、1000錠、 3000錠、バラ包装1000錠
イトプリド塩酸塩錠50mg「PH」	100錠、1000錠、 バラ包装1000錠
フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液25μg 小児用「PH」56噴霧用	4mL×5瓶

以上

この件に関するお問い合わせ先
株式会社キョーリン 経営企画部
TEL：03-3293-3414
FAX：03-3293-3454

<製品概要>

1. 製品名 和名：アムロジピン錠2.5mg「PH」・5mg「PH」
洋名：AMLODIPINE Tablets
2. 一般名 アムロジピンベシル酸塩(Amlodipine Besilate)
3. 効能・効果 高血圧症、狭心症
4. 用法・用量 ・高血圧症
通常、成人にはアムロジピンとして2.5～5mgを1日1回経口投与する。なお、症状に応じ適宜増減する。
・狭心症
通常、成人にはアムロジピンとして5mgを1日1回経口投与する。なお、症状に応じ適宜増減する。
5. 薬価 2.5mg1錠 28.40円、5mg1錠 52.90円
6. 包装 2.5mg：PTP包装 30錠、100錠、500錠、1000錠、3000錠
バラ包装 1000錠
5mg：PTP包装 30錠、100錠、500錠、1000錠、3000錠
バラ包装 1000錠
7. JANコード
アムロジピン錠2.5mg「PH」 30錠：4987154163026
アムロジピン錠2.5mg「PH」 100錠：4987154163019
アムロジピン錠2.5mg「PH」 500錠：4987154163040
アムロジピン錠2.5mg「PH」 1000錠：4987154163033
アムロジピン錠2.5mg「PH」 3000錠：4987154163057
アムロジピン錠2.5mg「PH」 バラ1000錠：4987154163330
アムロジピン錠5mg「PH」 30錠：4987154165020
アムロジピン錠5mg「PH」 100錠：4987154165013
アムロジピン錠5mg「PH」 500錠：4987154165044
アムロジピン錠5mg「PH」 1000錠：4987154165037
アムロジピン錠5mg「PH」 3000錠：4987154165051
アムロジピン錠5mg「PH」 バラ1000錠：4987154165334
8. 薬価収載日 2008年7月4日
9. 発売日 2008年7月4日

<製品概要>

1. 製品名 和名：イトプリド塩酸塩錠50mg「PH」
洋名：ITOPRIDE Hydrochloride Tablets
2. 一般名 イトプリド塩酸塩 (Itopride hydrochloride)
3. 効能・効果 慢性胃炎における消化器症状（腹部膨満感、上腹部痛、食欲不振、胸やけ、悪心、嘔吐）
4. 用法・用量 通常、成人にはイトプリド塩酸塩として1日150mgを3回に分けて食前に経口投与する。なお、年齢、症状により適宜減量する。
5. 薬価 50mg1錠 16.30円
6. 包装 PTP包装 100錠、1000錠
バラ包装 1000錠
7. JANコードイトプリド塩酸塩錠50mg「PH」 100錠：4987154161015
イトプリド塩酸塩錠50mg「PH」 1000錠：4987154161039
イトプリド塩酸塩錠50mg「PH」バラ1000錠：4987154161336
8. 薬価収載日 2008年7月4日
9. 発売日 2008年7月4日

<製品概要>

1. 製品名 和名：フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液 2.5 μ g 小児用「PH」56噴霧用
洋名：Fluticasone Propionate Nasal Solution 25 μ g for Pediatric“PH”
2. 一般名 フルチカゾンプロピオン酸エステル(Fluticasone Propionate)
3. 効能・効果 アレルギー性鼻炎、血管運動性鼻炎
4. 用法・用量 小児には、通常1回各鼻腔に1噴霧(フルチカゾンプロピオン酸エステルとして25 μ g)を1日2回投与する。なお、症状により適宜増減するが、1日の最大投与量は、8噴霧を限度とする。
5. 薬価 4mL1瓶 725.80円
6. 包装 4mL \times 5瓶
7. JANコード 5瓶：4987154593502
8. 薬価収載日 2008年7月4日
9. 発売日 2008年7月4日