



2014年12月12日

各 位

会 社 名 キョーリン製薬ホールディングス株式会社
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 山 下 正 弘
 (コード番号 4569 東証第1部)
 問 合 せ 先 コーポレートコミュニケーション統轄部長 宮木 修次
 電 話 03-3525-4707

2014年12月 新製品の発売のお知らせ

キョーリン製薬ホールディングス株式会社(本社 東京都千代田区、代表取締役社長 山下正弘)の子会社であるキョーリン リメディオ株式会社(本社 石川県金沢市、代表取締役社長 荻原茂)は2014年12月追補収載品3成分7品目をこの度、新発売いたします。

キョーリン リメディオ(株)では、調剤過誤の防止、患者さんの誤飲防止、アドヒアランスの向上の為の独自の工夫を行っています。今後も、信頼感のあるジェネリック医薬品を発売することにより健康貢献という企業理念の具現化を目指します。

記

追補収載品

品 名	包 装
カンデサルタン錠2mg「杏林」	PTP100錠
カンデサルタン錠4mg「杏林」	PTP100錠、PTP140錠 PTP500錠、バラ500錠
カンデサルタン錠8mg「杏林」	PTP100錠、PTP140錠 PTP500錠、バラ500錠
カンデサルタン錠12mg「杏林」	PTP100錠
ピタバスタチンCa錠4mg「杏林」	PTP100錠
レボフロキサシン錠250mg「杏林」	PTP50錠、PTP100錠
レボフロキサシン錠500mg「杏林」	PTP50錠、PTP100錠

以 上

<製品概要>

1. 製品名

和名：カンデサルタン錠2mg・4mg・8mg・12mg「杏林」

洋名：CANDESARTAN Tablets 2mg/4mg/8mg/12mg “KYORIN”

2. 一般名

カンデサルタン シレキセチル

3. 効能・効果

高血圧症、腎実質性高血圧症

4. 用法・用量

高血圧症

通常、成人には1日1回カンデサルタン シレキセチルとして4～8mgを経口投与し、必要に応じ12mgまで増量する。

ただし、腎障害を伴う場合には、1日1回2mgから投与を開始し、必要に応じ8mgまで増量する。

腎実質性高血圧症

通常、成人には1日1回カンデサルタン シレキセチルとして2mgから経口投与を開始し、必要に応じ8mgまで増量する。

5. 薬価

2mg 1錠：18.00円

4mg 1錠：34.90円

8mg 1錠：67.80円

12mg 1錠：85.90円

6. 包装及びJANコード/GS1DataBar (販売包装単位)

2mg	: PTP100錠	4987060306166/ (01) 14987060306163
4mg	: PTP100錠	4987060306173/ (01) 14987060306170
	: PTP140錠	4987060306180/ (01) 14987060306187
	: PTP500錠	4987060306197/ (01) 14987060306194
	: バラ500錠	4987060306579/ (01) 14987060306576
8mg	: PTP100錠	4987060306203/ (01) 14987060306200
	: PTP140錠	4987060306210/ (01) 14987060306217
	: PTP500錠	4987060306227/ (01) 14987060306224
	: バラ500錠	4987060306586/ (01) 14987060306583
12mg	: PTP100錠	4987060306234/ (01) 14987060306231

7. 薬価収載日

2014年12月12日

8. 発売日

2014年12月12日

9. 特徴

- ・錠剤の表に識別コード、裏に含量を刻印
- ・錠剤の両面に割線あり (2mg錠を除く)
- ・PTPの中央に製品名を大きく表示
- ・PTPに含量を見やすく表示
- ・PTPの一錠毎に成分名と含量を表示
- ・PTPに薬効「高血圧症の薬」を表示

<製品概要>

1. 製品名

和名：ピタバスタチンCa錠4mg「杏林」

洋名：PITAVASTATIN Ca Tablets 4mg “KYORIN”

2. 一般名

ピタバスタチンカルシウム水和物

3. 効能・効果

高コレステロール血症、家族性高コレステロール血症

4. 用法・用量

通常、成人にはピタバスタチンカルシウムとして1~2mgを1日1回経口投与する。

なお、年齢、症状により適宜増減し、LDL-コレステロール値の低下が不十分な場合には増量できるが、最大投与量は1日4mgまでとする。

5. 薬価

4mg 1錠：118.00円

6. 包装及びJANコード/GS1DataBar（販売包装単位）

4mg : PTP100錠 4987060306289 / (01) 14987060306286

7. 薬価収載日

2014年12月12日

8. 発売日

2014年12月12日

9. 特徴

- ・錠剤の表に識別コード、裏に含量を刻印
- ・PTPの中央に製品名を大きく表示
- ・PTPに含量を見やすく表示
- ・PTPの一錠毎に成分名と含量を表示
- ・PTPに薬効「高コレステロール血症治療薬」を表示

<製品概要>

1. 製品名

和名：レボフロキサシン錠250mg・500mg「杏林」

洋名：LEVOFLOXACIN Tablets 250mg/500mg “KYORIN”

2. 一般名

レボフロキサシン水和物

3. 効能・効果

<適応菌種>

本剤に感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、腸球菌属、淋菌、モラクセラ（ブランハメラ）・カタラーリス、炭疽菌、大腸菌、赤痢菌、サルモネラ属、チフス菌、パラチフス菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンシア属、ペスト菌、コレラ菌、インフルエンザ菌、緑膿菌、アシネトバクター属、レジオネラ属、ブルセラ属、野兎病菌、カンピロバクター属、ペプトストレプトコッカス属、アクネ菌、Q熱リケッチア（コクシエラ・ブルネティ）、トラコーマクラミジア（クラミジア・トラコマティス）、肺炎クラミジア（クラミジア・ニューモニエ）、肺炎マイコプラズマ（マイコプラズマ・ニューモニエ）

<適応症>

表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、ざ瘡（化膿性炎症を伴うもの）、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、乳腺炎、肛門周囲膿瘍、咽頭・喉頭炎、扁桃炎（扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む）、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、前立腺炎（急性症、慢性症）、精巣上体炎（副睾丸炎）、尿道炎、子宮頸管炎、胆嚢炎、胆管炎、感染性腸炎、腸チフス、パラチフス、コレラ、バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、涙嚢炎、麦粒腫、瞼板腺炎、外耳炎、中耳炎、副鼻腔炎、化膿性唾液腺炎、歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎、炭疽、ブルセラ症、ペスト、野兎病、Q熱

4. 用法・用量

通常、成人にはレボフロキサシンとして1回500mgを1日1回経口投与する。

なお、疾患・症状に応じて適宜減量する。

腸チフス、パラチフスについては、レボフロキサシンとして1回500mgを1日1回14日間経口投与する。

5. 薬価

250mg 1錠：126.80円

500mg 1錠：226.40円

6. 包装及びJANコード/GS1DataBar（販売包装単位）

250mg：PTP50錠 4987060306241／(01) 14987060306248

：PTP100錠 4987060306258／(01) 14987060306255

500mg：PTP50錠 4987060306265／(01) 14987060306262

：PTP100錠 4987060306272／(01) 14987060306279

7. 薬価収載日

2014年12月12日

8. 発売日

2014年12月12日

9. 特徴

- ・服用性向上を目的とした小型化錠剤
- ・錠剤の両面に成分、含量、屋号をレーザー印字
- ・錠剤の両面に割線あり（分割後も錠剤の識別可能）
- ・PTPに製品名、含量を見やすく表示
- ・PTPの一錠毎に成分名と含量を表示
- ・PTPに薬効「抗菌剤」及び用法「1日1回」を表示